

TAI ในการประเมินภาวะสุขภาพผู้สูงอายุ

ทำการประเมินสภาวะร่างกายและจิตใจ (การเคลื่อนไหว การกิน การใช้ห้องน้ำ การตัดสินใจ)
ตามแบบฟอร์มความสามารถทั้ง 4 ด้าน แล้วแบ่งแยกเป็น 3 กลุ่มใหญ่

1. **กลุ่ม B : Border group** : กลุ่มที่เป็นปกติ/มีภาวะเสี่ยง (B3, B4, B5)
2. **กลุ่ม C : Confused group** : กลุ่มที่มีความสับสน (Dementia) (C2, C3, C4)
3. **กลุ่ม I : Immobile group** : กลุ่มที่เคลื่อนไหวร่างกายเองไม่ได้ (I1, I2, I3)

กลุ่ม Border

กลุ่ม Border (ตัวย่อ คือ B) คือ กลุ่มที่เคลื่อนไหวได้ดี หรือต้องการช่วยเหลือบ้าง และมีอาการ Confuse น้อย ผู้สูงอายุ รับรู้ บุคคล เวลา สถานที่ และ ไม่มีปัญหาพฤติกรรมผิดปกติ อาจมีเพียง การสูญเสียความจำหรือการตัดสินใจบ้าง โดยแบ่งเป็นกลุ่มย่อย 3 กลุ่ม คือ

1. **กลุ่ม B3** คือ ผู้สูงอายุที่มีปัญหาในเรื่องการกินและการขับถ่ายมาก
2. **กลุ่ม B4** คือ ผู้สูงอายุที่มีปัญหาในเรื่องการกินและการขับถ่ายปานกลาง
3. **กลุ่ม B5** คือ ผู้สูงอายุที่ไม่มีปัญหาหรือมีปัญหาน้อยในเรื่องการกินและการขับถ่าย

กลุ่ม Confuse

กลุ่ม Confuse (ตัวย่อ คือ C) หรือกลุ่มผู้สูงอายุที่มีปัญหา จากมากไปน้อย ดังนี้

ผู้สูงอายุที่ไม่ตอบสนองต่อสิ่งเร้า หรือไม่รับรู้ บุคคล เวลา สถานที่ (Dis Orientation หรือมีปัญหาพฤติกรรม ซึ่งสร้างความรำคาญหรือความเดือดร้อนต่อผู้ดูแล หรือมีปัญหาในด้านการตัดสินใจหรือความจำ

โดยแบ่งเป็นกลุ่มย่อย 3 กลุ่ม คือ

1. กลุ่ม C2 คือ ผู้สูงอายุที่มีอาการ Confuse มาก ร่วมกับมีปัญหาด้านการกินอาหารและการขับถ่ายมาก
2. กลุ่ม C3 คือ ผู้สูงอายุที่มีอาการ Confuse มาก ร่วมกับมีปัญหาด้านการกินอาหารและการขับถ่ายปานกลาง
3. กลุ่ม C4 คือ ผู้สูงอายุที่มีอาการ Confuse มาก ร่วมกับมีปัญหาด้านการกินอาหารและการขับถ่ายน้อย

กลุ่ม Immobilize

กลุ่ม Immobilize (ตัวย่อ คือ I) หรือกลุ่มผู้สูงอายุที่ไม่สามารถเคลื่อนที่ของร่างกาย

โดยแบ่งเป็นกลุ่มย่อย 3 กลุ่ม คือ

- 1.กลุ่ม I1 คือ ผู้สูงอายุที่มีการเคลื่อนที่ได้น้อย(ติดเตียง) และมีปัญหาด้านการกินอาหารมาก
- 2.กลุ่ม I2 คือ ผู้สูงอายุที่เคลื่อนที่ได้น้อย(ติดเตียง) และมีปัญหาด้านการกินอาหารปานกลาง
- 3.กลุ่ม I3 คือ ผู้สูงอายุที่เคลื่อนที่ได้น้อย(ติดเตียง) และมีปัญหาด้านการกินอาหารเล็กน้อย

<p>ได้ค่าประเมิน ADL เท่ากับ 5 ในทุกด้าน (สุขภาพจิต, ความสามารถในการเคลื่อนไหว, การรับประทานอาหาร, และการขับถ่าย)</p>	<p>ได้ค่าประเมิน ADL เท่ากับ 4 หรือ 5 ทั้งด้านการรับประทานอาหารและการขับถ่าย</p>	<p>ได้ค่าประเมิน ADL เท่ากับ 3 หรือน้อยกว่า ในด้านการรับประทานอาหารหรือการขับถ่าย</p>	<p>ได้ค่าประเมิน ADL มากกว่า 4 ทั้งด้านการรับประทานอาหารและการขับถ่าย</p>	<p>ได้ค่าประเมิน ADL >4 ในด้านการรับประทานอาหารและ <3 ในด้านการขับถ่ายหรือ >4 ในด้านการขับถ่ายหรือ และ <3 ในด้านการรับประทานอาหาร</p>	<p>ได้ค่าประเมิน ADL น้อยกว่า 3 ทั้งด้านการรับประทานอาหาร</p>	<p>ได้ค่าประเมิน ADL เท่ากับ 4 หรือ 5 ในด้านการรับประทานอาหาร</p>	<p>ได้ค่าประเมิน ADL เท่ากับ 3 ในด้านการรับประทานอาหาร</p>	<p>ได้ค่าประเมิน ADL เท่ากับ 2 หรือน้อยกว่า ในด้านการรับประทานอาหาร</p>
---	--	---	---	---	---	---	--	---

กลุ่ม Border

กลุ่ม Confuse

กลุ่ม Immobilize

B 5

B 4

B 3

C 4

C 3

C 2

I 3

I 2

I 1

การแบ่งผู้สูงอายุที่สูญเสีย **Function** เป็น 3 กลุ่มใหญ่ 9 กลุ่มย่อย เพื่อนำไปใช้ในการวางแผนการรักษาที่แตกต่างกันและการคำนวณต้นทุนค่าใช้จ่ายที่แตกต่างกัน

Classified Disability in Elderly by TAI

